COLLOQUE SCIENTIFIQUE FIRENDO

2^{ème} ÉDITION

« DIMORPHISME SEXUEL
DANS LES MALADIES RARES
ENDOCRINIENNES »

MARDI
11 DÉCEMBRE
2018

DIMORPHISME SEXUEL DE LA COMMANDE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE, DONNÉES RÉCENTES ET APPROCHE CHEZ LE FŒTUS

Dr Fabien Guimiot

Pr Nicolas de Roux

INSERM UMR 1141, Equipe NeuroDev, Hôpital universitaire Robert Debré,
Paris

Inserm

université
PARIS
DIDEROT
PARIS 7

Axe gonadotrope

Dimorphisme sexuel physiologique de l'activation de l'axe gonadotrope

STADES		♀	♂
Après la naissance	Minipuberté	Persistance > 3 mois	Court < 3mois
Adolescence	Puberté	8-13	9-14
A l'âge adulte	Hormones	Œstrogènes + progestérone	Testostérone
	Rétrocontrôles	Positif et négatif	Négatif

Dosages sériques de FSH et de LH

(Guimiot F., et al. JCEM 2012)

Hypophyses

Dosage hypophysaire des gonadotrophines

Sécrétion des gonadotrophines indépendantes du contrôle de l'hypothalamus à mi-grossesse

Dosages sériques de FSH et de LH (foetus arhinencéphale)

(Guimiot F., et al. JCEM 2012)

Expression des gènes de l'axe gonadotrope

qPCR

- Quels sont les facteurs moléculaires à l'origine de ces différences transcriptionnelles ?

Microarrays

- 118 gènes différentiellement exprimés :
 - ✓ 96 ARN codants
 - ✓ Gènes des chromosomes Y et de l'X
 - ✓ 22 ARN non codants dont 3 miRNA

ZEB2 mRNA relative expression vs 18S

ESM1 mRNA relative expression vs 18S

(S. Quentin)

Protéine SIP1 (codée par *ZEB2*)

Expression de SIP1 totale normalisée à l'actine

Expression de SIP1 non sumoylée normalisée à l'actine

- Marquage de SIP1 nucléaire et punctiforme.
- Majorité des cellules SIP1+ → cellules gonadotropes.

Gènes impliqués dans la transition épithélio-mésenchymateuse

www.impactjournals.com/oncotarget/

Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 8), pp: 13886-13897

Research Paper

Loss of endothelial cell-specific molecule 1 promotes the tumorigenicity and metastasis of prostate cancer cells through regulation of the TIMP-1/ MMP-9 expression

Chien-Min Chen^{1,2}, Chu-Liang Lin³, Hui-Ling Chiou⁴, Shu-Ching Hsieh⁴, Chia-Liang Lin³, Chun-Wen Cheng³, Chia-Hung Hung³, Jen-Pi Tsai^{5,6}, Yi-Hsien Hsieh^{3,7,8}

miR-200 promotes the mesenchymal to epithelial transition by suppressing multiple members of the Zeb2 and Snail1 transcriptional repressor complexes.

Perdigao-Henriques, R., Petrocca, F., Altschuler, G. et al. (5 more authors) (2015) *miR-200 promotes the mesenchymal to epithelial transition by suppressing multiple members of the Zeb2 and Snail1 transcriptional repressor complexes*. *Oncogene*, 35. pp. 158-172. ISSN 0950-9232

(Oncogene 2016)

Transition épithélio-mésenchymateuse dans l'hypophyse en développement

(Perez-Millan et al., 2016 *elife*)

Conclusion 1

- L'hypophyse foétale des filles et des garçons ne seraient pas dans le même état de différenciation (pas au même stade d'EMT)
- L'hypophyse des filles serait plus « épithéliale » et celle des garçons plus « mésenchymateuse »
-
- Quel rapport avec la sécrétion des gonadotrophines ?

Gène dimorphique dans le syndrome de Kallmann

- *KAL1* ou *ANOS1*: gène exprimé dans la région pseudo-autosomale du chromosome X
- Phénotype de Kallmann chez les hommes et pas chez la femme

The *KAL1* protein anosmin-1 sequences from human (NP_000207), chimpanzee (XP_520920), horse (XP_001488441), opossum (XP_001381237), platypus (XP_001514907), chicken (P33005), frog (NP_001107160), zebrafish 1a (AAH60938) and 1b (AAF25780), Medaka 1.1 (NP_001098319) and 1.2 (NP_001098189), fruit fly (AF342988), and nematode (NP_493468) were retrieved from GenBank (<http://www.ncbi.nlm>).

Arguments pour une expression de KAL1 dans l'hypophyse foétale humaine

BIOLOGY OF REPRODUCTION **84**, 595–603 (2011)
Published online before print 1 December 2010.
DOI 10.1095/biolreprod.110.087437

Kallmann Syndrome 1 Gene Is Expressed in the Marsupial Gonad¹

Yanqiu Hu,^{4,5} Hongshi Yu,^{4,5} Geoff Shaw,^{4,5} Andrew J. Pask,^{3,4,5,6} and Marilyn B. Renfree^{2,3,4,5}

Expression d'*ANOS1* dans l'hypophyse fœtale

Gene Symbol	Male sample 1	Male sample 2	Male sample 3	Male sample 4	Male sample 5	Female sample 1	Female sample 2	Female sample 3	Female sample 4
KAL1	9.557472	8.258673	9.326777	9.335529	8.777033	9.14884	9.343804	9.459965	9.513759

A

B

Expression de la protéine *ANOSMIN* dans l'hypophyse fœtale

Expression de SOX2 et de l'*ANOSMIN* dans les cellules corticotropes

Conclusion 2

- Le gène *ANOS1* est exprimé dans l'hypophyse fœtale
- Absence d'expression différentielle entre les fœtus filles et garçons (en microarrays)
- La protéine ANOSMIN est exprimée spécifiquement dans les cellules corticotropes
- Les cellules corticotropes expriment également un marqueur de cellules « souches » SOX2
- Rôle de l'ANOSMIN dans les cellules corticotropes ?

Perspectives

- Etudier l'expression de l'ANOSMIN dans des hypophyses foétales de garçons
- Y-a-t-il des différences entre les hypophyses de foetus filles et celles de garçons ?
- Avancer sur la caractérisation des cellules SOX2 +,
 - ✓ Ont-elles des capacités de cellules souches ?
 - ✓ Peuvent-elles retourner à l'état de cellules souches et donner naissances à toutes les cellules de l'hypophyse ?

INSERM U1141. Robert Debré Hospital

- Audrey Ridoux
- Solène Leroy
- Adeline Bonnard
- Nicolas de Roux

- Juliane Léger
- Jean-Claude Carel
- Dominique Simon